

Дапоксетин - Инструкция по применению

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(Информация для потребителей)
Дапоксетин (дапоксетина гидрохлорид)
Priligy

Внимание! Препарат, который вы получили, является дженериком препарата Priligy, то есть его аналогом.

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед началом приема препарата.

- Сохраните инструкцию. Возможно, вы захотите прочитать ее еще раз.
- Если вам будет что-то непонятно или у вас возникнут дополнительные вопросы, то обратитесь к врачу или фармацевту.

1. Общие сведения о препарате.

Дапоксетин (дапоксетина гидрохлорид)

1.1. Лекарственная форма и назначение

Таблетки, покрытые оболочкой, для применения внутрь.

1.2. Состав

Активное вещество: дапоксетина гидрохлорид 60 мг.

2. Показания к применению

Предотвращение и лечение преждевременного семяизвержения у мужчин.

3. Противопоказания

Применение дапоксетина строго противопоказано:

- лицам, не достигшим 18-ти лет;
- лицам старше 65 лет;
- одновременное применение в любых дозах и формах ингибиторов моноаминоксидазы (в предшествующие 2 недели), нитратов, антидепрессантов, тиоридазина, лития, противовирусных препаратов (сакинавир, ритонавир), имидазолов (итра- и кетоконазол), ингибиторов цитоцитов, трамадола;
- лицам с острой и хронической сердечной недостаточностью II-IV степени;
- лицам с атриовентрикулярными блокадами 2-3 класса;
- лицам с болезнью атриовентрикулярного узла сердца;
- лицам с почечной и выраженной печеночной недостаточностью;
- лицам с эпилепсией, болезнью Паркинсона;
- лицам, употребляющим наркотические средства (кетамин, амфетамины, ЛСД).

Применение при беременности и лактации.

Дапоксетин - Инструкция по применению

По зарегистрированному показанию препарат не предназначен для применения у женщин.

Применение у детей.

Дапоксетин запрещается давать детям.

4. Способ применения и дозы.

Дапоксетин принимают внутрь, по одной таблетке за 1-3 часа до планируемой сексуальной близости.

Таблетку рекомендуется запивать водой. Прием возможен как "до", так и "после" приема пищи. Нежелательно принимать Дапоксетин совместно с алкоголем.

Максимальная доза – 60 мг в сутки (т.е одна таблетка).

Эффект от приема препарата наблюдается через 30 минут -2 часа.

Дапоксетин (Прилиджи) полностью выводится из организма через сутки.

5. Побочное действие.

Побочные эффекты незначительные либо умеренные. К ним относятся: головокружение, головная боль, тошнота, диарея.

Если у вас возникнут любые нежелательные эффекты при приеме Дапоксетина, которые не указаны в данной инструкции, обратитесь к врачу или фармацевту.

6. Условия хранения.

При температуре не выше 30°C , в сухом недоступном для детей месте.

7. Срок годности.

Не принимайте препарат после даты окончания срока годности, указанной на упаковке.