

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ  
(Информация для потребителей)  
Super P-force (Силденафил + Дапоксетин)

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед началом приема препарата.

- Сохраните инструкцию. Возможно, вы захотите прочитать ее еще раз.
- Если вам будет что-то непонятно или у вас возникнут дополнительные вопросы, то обратитесь к врачу или фармацевту.

## *1. Общие сведения о препарате.*

Super P-force (Силденафил + Дапоксетин)

### *1.1. Лекарственная форма и назначение*

Таблетки, покрытые оболочкой, для применения внутрь.

### *1.2. Состав*

Активное вещество: силденафил и дапоксетина гидрохлорид.

## *2. Показания к применению*

Предотвращение и лечение нарушений эрекции и преждевременного семяизвержения у мужчин.

## *3. Противопоказания*

*Применение Super P-force строго противопоказано:*

- лицам, не достигшим 18-ти лет;
- лицам старше 65 лет;
- одновременное применение в любых дозах и формах ингибиторов моноаминоксидазы (в предшествующие 2 недели), нитратов, антидепрессантов, тиоридазина, лития, противовирусных препаратов (сакинавир, ритонавир), имидазолов (итра- и кетоконазол), ингибиторов цитоцитов, трамадола;
- одновременное применение препарата в любых дозах и формах с донаторами оксида азота или нитратами (Сустак, Нитроглицерин, Нитронг, Нитросорбид, Эринит и др.);
- одновременное применение препарата с афродизиаками: амилнитритами или нитритами (попперсами);
- лицам с острой и хронической сердечной недостаточностью II-IV степени;
- при острой сердечной недостаточности, аритмии, артериальной гипертензии (артериальное давление (АД) > 170/100 мм рт. ст.;) или гипотония (АД < 90/50 мм рт. ст.);
- при нестабильной стенокардии, а также мужчинам, перенесшим острый инфаркт миокарда, инсульт в последние 6 месяцев;

## Super P-force - Инструкция по применению

---

- лицам с атриовентрикулярными блокадами 2-3 класса;
- лицам с болезнью атриовентрикулярного узла сердца;
- лицам с почечной и выраженной печеночной недостаточностью;
- лицам с эпилепсией, болезнью Паркинсона;
- лицам, употребляющим наркотические средства (кетамин, амфетамины, ЛСД).

*Применение при беременности и лактации.*

По зарегистрированному показанию препарат не предназначен для применения у женщин.

*Применение у детей.*

Super P-force запрещается давать детям.

*4. Способ применения и дозы.*

Super P-force принимают внутрь, по одной таблетке за 30-60 минут до планируемой сексуальной близости.

Таблетку рекомендуется запивать водой. Нежелательно принимать Super P-force совместно с алкоголем.

Максимальная доза – Силденафила цитрат 100 мг + Дапоксетин 60 мг (одна таблетка в сутки).

Эффект от приема препарата наблюдается через 30 минут -2 часа.

Super P-force полностью выводится из организма через сутки.

*5. Побочное действие.*

Побочные эффекты незначительные либо умеренные. К ним относятся: головокружение, головная боль, тошнота, диарея, заложенность носа, нарушение цветовосприятия синих и зеленых оттенков.

Если у вас возникнут любые нежелательные эффекты при приеме Super P-force, которые не указаны в данной инструкции, обратитесь к врачу или фармацевту.

*6. Условия хранения.*

При температуре не выше 30°C , в сухом недоступном для детей месте.